



Verhalten vor operativen Eingriffen

Liebe Patientin, lieber Patient,

Um Komplikationen zu vermeiden, sollten Sie folgende Verhaltensmaßregeln zur Vorbereitung auf die Behandlung beachten.

Verkehrsmittel

Bitte beachten Sie, daß sowohl die Lokalanästhesie als auch mögliche präoperative Sedierungen zu Beeinträchtigungen der Verkehrstauglichkeit führen können. Sie sollten daher auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf Verwandte oder Bekannte zurückgreifen, um unnötige Risiken zu vermeiden.

Essen

Bitte kommen Sie nicht mit leerem Magen zum Behandlungstermin. Essen Sie etwa 1 Stunde vor der Operation noch etwas. Die Lokalanästhesie wirkt am besten, wenn der Magen gefüllt ist.

Medikamente

Nehmen Sie mindestens 48 Stunden vor der Operation keine Medikamente mehr ein, die Acetylsalicylsäure enthalten (z.B. Aspirin, Ass oder Kombinationspräparate). Diese Medikamente reduzieren die Blutgerinnung und können somit Nachblutungen provozieren.

Bitte teilen Sie mir alle Medikamente und Erkrankungen mit, auch wenn Sie Ihnen im Zusammenhang mit einem zahnärztlichen Eingriff unwichtig erscheinen.

Sedierung

Falls Sie eine Sedativum (Beruhigungsmittel) präoperativ (vor dem Eingriff) benötigen, kommen Sie etwa 30 Minuten vor dem eigentlichen Behandlungstermin in die Praxis.

Antibiotika

Wenn Ihnen Antibiotika verordnet wurden, nehmen Sie diese bitte entsprechend der Anweisungen ein und enden nicht vorzeitig.

Alkohol

Bitte trinken Sie mindestens 12 Stunden vor der Operation keinen Alkohol mehr.

Nachsorge

Bitte bereiten Sie Maßnahmen vor, die Ihre postoperativen Folgeerscheinungen lindern können:

- Kühlung
- Medikamente
- Betreuung, wenn ein größerer Eingriff vorgesehen ist
- Bei Sedierung mit bestimmten Medikamenten muss eine 24 - stündige Überwachung gewährleistet sein

Ihr Dr. E. Uhl